

## SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

### 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Visipaque 270 mg I/ml injekční roztok

Visipaque 320 mg I/ml injekční roztok

### 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka	Síla	Obsah v 1 ml
Iodixanolum	270 mg I/ml	550 mg odp. 270 mg I
	320 mg I/ml	652 mg odp. 320 mg I

Iodixanolum (jodixanol) je neionická, dimérní, hexajodovaná, vodorozpustná kontrastní rentgenová látka. Čisté vodné roztoky jodixanolu mají ve všech klinických relevantních koncentracích nižší osmolalitu než všechny složky krve a odpovídající síly neionických monomerních kontrastních látek.

Hodnoty osmolality a viskozity přípravku Visipaque jsou následující:

Koncentrace	Osmolalita * (mOsm/kg H <sub>2</sub> O)	Viskozita (mPa·s)	
	37 °C	20 °C	37 °C
270 mg I/ml	290	11,3	5,8
320 mg I/ml		25,4	11,4

\* Metoda: Osmometrie tlaku nasycených par

Pomocná látka se známým účinkem:

Visipaque 270 mg I/ml obsahuje 0,76 mg (0,03 mmol) sodíku na ml. Visipaque 320 mg I/ml obsahuje 0,45 mg (0,02 mmol) sodíku na ml. To je třeba vzít v úvahu u pacientů s dietou s nízkým obsahem sodíku (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

### 3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Přípravek Visipaque je dodáván jako čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok, prakticky prostý částic.

### 4. KLINICKÉ ÚDAJE

#### 4.1 Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Rentgenová kontrastní látka, která se u dospělých používá pro angiokardiografiu, cerebrální angiografii (konvenční), periferní arteriografiu (konvenční), abdominální angiografii (i.a. DSA), urografii, venografii, zesílení kontrastu při CT vyšetření a vyšetření gastrointestinálního traktu. U dospělých se dále používá pro lumbální, torakální a cervikální myelografii, artrografii a hysterosalpingografii (HSG). U dětí se používá pro angiokardiografiu, urografii, zesílení kontrastu při CT vyšetření a vyšetření gastrointestinálního traktu.

## 4.2 Dávkování a způsob podání

### Dávkování

Dávka se může lišit podle druhu vyšetření, věku, hmotnosti, srdečního výkonu a celkového stavu pacienta a použité techniky. Obvykle je používána přibližně stejná koncentrace a objem jodu jako u jiných, v současnosti běžně používaných, jodovaných kontrastních rentgenových látek, nicméně v některých studiích s využitím injekce jodixanolu byly dostačující diagnostické informace získány také s využitím poněkud nižší koncentrace jodu.

Jako návod lze použít následující dávkování. Dávky uvedené pro intraarteriální podání platí pro jednorázové injekce, které mohou být opakovány.

Indikace/vyšetření	Koncentrace	Objem
<b>Intraarteriální podání</b>		
<b>Arteriografie</b>		
<u>Dospělí</u>		
Selektivní cerebrální	270/320 <sup>(1)</sup> mg I/ml	5–10 ml/inj.
Aortografie	270/320 mg I/ml	40–60 ml/inj.
Periferní	270/320 mg I/ml	30–60 ml/inj.
Selektivní viscerální i.a. DSA	270 mg I/ml	10–40 ml/inj.
<b>Angiokardiografie</b>		
<u>Dospělí</u>		
Injekce do levé komory a kořene aorty	320 mg I/ml	30–60 ml/inj.
Selektivní koronarografie	320 mg I/ml	4–8 ml/inj.
<u>Děti</u>	270/320 mg I/ml	závisí na věku, hmotnosti a patologickém procesu (doporučená maximální celková dávka je 10 ml/kg)

<sup>(1)</sup> Obě síly byly zkoušeny v rámci klinických studií, ve většině případů je však doporučováno 270 mg I/ml.

Indikace/vyšetření	Koncentrace	Objem
--------------------	-------------	-------

Intravenózní podání			
<b>Urografie</b>			
<u>Dospělí</u>	270/320 mg I/ml	40–80 ml <sup>(2)</sup>	
<u>Děti</u> < 7 kg	270/320 mg I/ml	2–4 ml/kg	
<u>Děti</u> > 7 kg	270/320 mg I/ml	2–3 ml/kg	všechny dávky závisí na věku, hmotnosti a patologickém procesu (max. 50 ml)
<b>Venografie</b>			
<u>Dospělí</u>	270 mg I/ml	50–150 ml/končetinu	
<b>Zesílení kontrastu při CT vyšetření</b>			
<u>Dospělí</u>			
CT hlavy	270/320 mg I/ml	50–150 ml	
CT těla	270/320 mg I/ml	75–150 ml	
<u>Děti</u>			
CT hlavy a těla	270/320 mg I/ml	2–3 ml/kg až do 50 ml (v některých případech může být podáno až 150 ml)	

<sup>(2)</sup> Při vysokodávkové urografii mohou být podány vyšší dávky.

Indikace/vyšetření	Konzentrace	Objem
<b>Intratekální podání (pouze dospělí)</b>		
<b>Lumbální a torakální myelografie</b> (lumbální injekce)	270 mg I/ml nebo 320 mg I/ml	10–12 ml <sup>(3)</sup> 10 ml <sup>(3)</sup>
<b>Cervikální myelografie</b> (cervikální nebo lumbální injekce)	270 mg I/ml nebo 320 mg I/ml	10–12 ml <sup>(3)</sup> 10 ml <sup>(3)</sup>

<sup>(3)</sup> Pro minimalizaci možných nežádoucích účinků se nedoporučuje překročení celkové dávky 3,2 g jodu.

Indikace/vyšetření	Konzentrace	Objem
<b>Podání do tělních dutin</b>		
Dávkování musí být individuálně upraveno pro dosažení optimálního zobrazení		
<b>Arthrografie</b>		
<u>Dospělí</u>	270 mg I/ml	1–15 ml

<b>Hysterosalpingografie (HSG)</b>		
<u>Dospělí</u>	270 mg I/ml	5–10 ml doporučená dávka může být několikrát překročena v důsledku např. zpětného toku do pochvy (bylo testováno až <u>40 ml</u> )

Indikace/vyšetření	Koncentrace	Objem
<b>Vyšetření gastrointestinálního traktu</b>		
<b>Perorální podání</b>		
<u>Dospělí</u>		
Průchodnost tenkého střeva	320 mg I/ml	80–200 ml bylo testováno
Jícen	320 mg I/ml	10–200 ml bylo testováno
Žaludek	320 mg I/ml	20–200 ml bylo testováno
<u>Děti</u>	270/320 mg I/ml	5 ml/kg tělesné hmotnosti (10–240 ml) bylo testováno
<b>Rektální podání</b>		
<u>Děti</u>	270/320 mg I/ml	30–400 ml bylo testováno

U starších pacientů a pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin mohou být použity obvyklé/navrhované dávky pro dospělé.

#### Způsob podání

Kontrastní látka je určena pro intraarteriální, intravenózní, intratekální a perorální podání a podání do tělních dutin.

Stejně jako u jiných kontrastních látek je třeba před podáním látky a po něm zajistit patřičnou hydrataci.

#### **4.3 Kontraindikace**

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Manifestní tyreotoxikóza.

#### **4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití**

##### Obecná zvláštní upozornění pro použití neionických kontrastních látek

*Hypersenzitivita*

Pozitivní anamnéza alergie, astmatu nebo nepříznivých reakcí na jodované kontrastní látky poukazují na potřebu zvláštní opatrnosti. V těchto případech je možné zvážit premedikaci kortikosteroidy nebo antagonisty histaminu H<sub>1</sub> a H<sub>2</sub>.

Riziko závažných reakcí v souvislosti s podáním přípravku Visipaque je považováno za nízké. Jodované kontrastní látky však mohou vyvolat anafylaktoidní reakce nebo jiné projevy hypersenzitivity.

Je vždy potřebné brát ohled na možnost výskytu projevů hypersenzitivity, včetně závažných, život ohrožujících, fatálních anafylaktických/anafylaktoidních reakcí. K výskytu většiny závažných nežádoucích účinků dochází v průběhu prvních 30 minut. Může dojít k výskytu pozdního nástupu hypersenzitivní reakce (ke kterému dochází 1 hodinu a více po podání). Proto by pro případ výskytu závažné reakce měl být předem připraven postup a dostupné potřebné léky a vybavení pro okamžitou léčbu. K zajištění rychlého intravenózního přístupu je vždy doporučováno po celou dobu RTG vyšetření používat zavedenou kanylu nebo katétr.

Po podání kontrastní látky může použití beta adrenergních blokátorů snížit práh pro vznik bronchospasmu u astmatických pacientů a snížit schopnost reakce na léčbu adrenalinem.

Pacienti mají být po dobu 30 minut po podání přípravku Visipaque pod dohledem.

#### *Koagulopatie*

V porovnání s ionickými kontrastními látkami mají neionické jodované kontrastní látky menší vliv na koagulační systém *in vitro*. Byla zaznamenána tvorba sraženin v případech, kdy krev zůstala v kontaktu se stříkačkami obsahujícími kontrastní látky, včetně neionických láttek. Při použití plastových stříkaček namísto skleněných stříkaček bylo zaznamenáno snížení, avšak ne zcela eliminování, pravděpodobnosti tvorby sraženin *in vitro*.

V průběhu angiokardiografických vyšetření s použitím ionických i neionických kontrastních láttek byly hlášeny závažné, vzácně fatální, tromboembolické příhody způsobující infarkt myokardu a mozkovou mrtvici. Pro minimalizaci tromboembolických příhod je proto nutné využít velmi pečlivé techniky intravaskulárního podání, zejména v průběhu angiografických vyšetření. K rozvoji tromboembolické příhody může přispět řada faktorů, včetně délky vyšetření, typu materiálu katétru a stříkačky, již existujícího základního onemocnění a souběžné medikace. Z těchto důvodů jsou doporučovány velmi pečlivé angiografické techniky, včetně zvýšené pozornosti věnované vodiči a manipulaci s katérem, použití rozdělovačů a/nebo trícestných kohoutků, častému proplachování katétru (např. heparinizovaným fyziologickým roztokem) a minimalizaci délky vyšetření. Měla by být snadno dostupná moderní zařízení pro podporu životních funkcí.

Pozornost je třeba věnovat pacientům s homocystinurií (s ohledem na riziko výskytu tromboembolismu).

#### *Hydratace*

Před a po podání kontrastní látky má být zajištěna dostatečná hydratace. Týká se to zejména pacientů s mnohočetným myelomem, diabetem mellitem, renální dysfunkcí, stejně jako kojenců, malých dětí a starších pacientů. Kojenci (ve věku < 1 rok) a především novorozenci jsou náchylní na poruchy elektrolytů a hemodynamické změny.

#### *Kardiovaskulární reakce*

Péči je také třeba věnovat pacientům se závažným srdečním onemocněním a plicní hypertenzí, u nichž může dojít k hemodynamickým změnám nebo arytmii. Vzácně se vyskytly závažné, život ohrožující reakce a úmrť kardiovaskulárního původu, jako zástava srdce, kardiorespirační zástava a infarkt myokardu.

#### *Poruchy CNS*

Při použití jodixanolu byla hlášena encefalopatie (viz bod 4.8).

Encefalopatie indukovaná kontrastní látkou se může během několika minut až hodin po podání jodixanolu projevit známkami a příznaky neurologické dysfunkce, jako jsou bolest hlavy, porucha zraku, kortikální slepota, zmatenosť, záchvaty, ztráta koordinace, hemiparéza, afázie, bezvědomí, kóma a mozkový edém, a odeznívá obvykle v průběhu několika dní.

Přípravek má být používán s opatrností u pacientů s onemocněními, která narušují integritu hematoencefalické bariéry (HEB), což může potenciálně vést ke zvýšené propustnosti HEB pro kontrastní látky a ke zvýšení rizika encefalopatie.

Zvláštní péči vyžadují pacienti s akutním cerebrálním onemocněním, nádory nebo anamnézou epilepsie, kteří mají predispozice k záchvatům křečí. Zvýšené riziko záchvatů křečí a neurologických reakcí hrozí i pacientům závislým na alkoholu a drogově závislým. S ohledem na intravaskulární podání je třeba věnovat péči pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou nebo akutním intrakraniálním krvácením, pacientům s narušenou hematoencefalickou bariérou, otokem mozku nebo akutní demyelinizací.

V případě podezření na encefalopatií indukovanou kontrastní látkou má být podávání jodixanolu přerušeno a má být zahájena vhodná lékařská péče.

#### *Renální reakce*

Hlavním rizikovým faktorem pro kontrastní látkou indukovanou nefropatií je základní porucha funkce ledvin. Přispívajícími faktory v přítomnosti renální dysfunkce jsou diabetes mellitus a objem podané jodované kontrastní látky. Dalšími jsou dehydratace, pokročilá arterioskleróza, snížená renální perfuze a přítomnost dalších faktorů, které mohou působit nefrotoxicky, jako jsou vybrané druhy léků nebo větší chirurgický zákrok.

V rámci prevence před akutním renálním selháním po podání kontrastní látky je třeba věnovat zvýšenou pozornost i pacientům s narušenou funkcí ledvin nebo diabetem mellitem. Riziko hrozí i u pacientů s paraproteinémií (myelomatózou a Waldenströmovou makroglobulinémií).

#### Preventivní opatření zahrnují:

- identifikaci vysoko rizikových pacientů,
- zajištění přiměřené hydratace. Pokud je to nutné, pak i i.v. infúzí před podáním přípravku až do vyloučení kontrastní látky ledvinami.
- vyvarování se další zátěže ledvin nefrotoxicckými léky, perorálními cholecystografickými látkami, svorkováním tepen, renální arteriální angioplastikou nebo větším chirurgickým zákrokem, a to až do okamžiku, než bude kontrastní látka z těla vyloučena,
- snížení dávky na minimum,
- odložení opakování vyšetření kontrastní látkou do doby, než renální funkce dosáhne hodnot před prvním vyšetřením.

Jodované kontrastní látky mohou být použity u pacientů na hemodialýze, protože tyto látky jsou dialyzačním procesem z těla odstraněny.

### *Diabetičtí pacienti léčení metforminem*

Intravaskulární vyšetření s jodovanými kontrastními látkami mohou vést k náhlé změně renální funkce. Před podáním jodovaných kontrastních láttek je nutné monitorovat hodnotu S kreatininu (sérový kreatinin), aby se u pacientů užívajících metformin předešlo nebezpečí rozvoje laktátové acidózy.

- (1) Pacienti s eGFR rovným nebo vyšším než 60 ml/min./1,73 m<sup>2</sup> (CKD 1 a 2) mohou normálně pokračovat v užívání metforminu.
- (2) Pacienti s eGFR 30–59 ml/min./1,73 m<sup>2</sup> (CKD 3)
  - Pacienti s eGFR rovným nebo vyšším než 45 ml/min./1,73 m<sup>2</sup>, kterým je intravenózně podána kontrastní látka, mohou normálně pokračovat v užívání metforminu.
  - Pacienti s eGFR v rozmezí 30–44 ml/min./1,73 m<sup>2</sup>, kterým je intraarteriálně nebo intravenózně podána kontrastní látka, mají přerušit užívání metforminu po dobu 48 hodin před podáním kontrastní látky a jeho užívání má být znova zahájeno 48 hodin po podání kontrastní látky v případě, že nedošlo ke zhoršení renální funkce.
- (3) V případě pacientů s eGFR nižším než 30 ml/min./1,73 m<sup>2</sup> (CKD 4 a 5) nebo s interkurentním onemocněním způsobujícím sníženou funkci jater nebo hypoxii je metformin kontraindikován a je třeba se vyhnout použití jodovaných kontrastních láttek.
- (4) V případě akutních pacientů, u nichž je renální funkce narušená nebo neznámá, má lékař zvážit riziko a přínos vyšetření kontrastní látkou. Užívání metforminu má být pozastaveno v době podání kontrastní látky. Je nutné zajistit dostatečnou hydrataci pacienta. Po vyšetření má být pacient sledován s ohledem na příznaky laktátové acidózy. Pokud nedojde ke změnám hodnot sérového kreatininu/eGFR v porovnání s hodnotami před vyšetřením, má být užívání metforminu znova zahájeno 48 hodin po podání kontrastní látky.

### *Porucha funkce ledvin a jater*

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin a jater, u kterých je prokazatelně opožděná clearance kontrastní látky.

### *Myasthenia gravis*

Podání jodovaných kontrastních láttek může zhoršit projevy myasthenia gravis.

### *Feochromocytom*

Pacientům s feochromocytomem, kteří podstupují intervenční zákrok, mají být před vyšetřením profylakticky podány alfa-blokátory k prevenci hypertenzní krize.

### *Poruchy funkce štítné žlázy*

U pacientů s manifestní, ale dosud nediagnostikovanou hypertyreózou, pacientů s projevy latentní hypertyreózy (např. nodulární strumou) a pacientů s funkční autonomií štítné žlázy (často např. u starších pacientů, především v oblastech s nedostatkem jodu) může podání jodovaných kontrastních láttek vést k vyššímu riziku vzniku akutní tyreotoxicózy. Před podáním jodované kontrastní látky má být u těchto pacientů vyhodnoceno dodatečné riziko. U pacientů s podezřením na hypertyreózu má být před podáním kontrastní látky zváženo podstoupení testů funkčnosti štítné žlázy a/nebo preventivní tyreostatická léčba. Rizikové pacienty je třeba v průběhu několika týdnů po podání sledovat s ohledem na možnost rozvoje tyreotoxicózy.

Po podání jodovaných kontrastních látkek dospělým a pediatrickým pacientům, včetně kojenců, byly hlášeny testy funkce štítné žlázy indikující hypothyreózu nebo přechodnou supresi štítné žlázy. Některí pacienti byli léčeni na hypothyreózu.

### Pediatrická populace

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pediatrickým pacientům mladším 3 let, protože příhoda s nedostatečnou činností štítné žlázy v útlém věku může ovlivnit motorický vývoj, vývoj sluchu a kognitivní vývoj, a může vyžadovat přechodnou substituční terapii T4. Výskyt hypotyreózy u pacientů mladších 3 let vystavených jodovaným kontrastním látkám byl hlášen v rozmezí 1,3–15 % v závislosti na jejich věku a dávce jodované kontrastní látky, a je častěji pozorován u novorozeneců a předčasně narozených dětí. Novorozenci mohou být také vystaveni kontrastním látkám prostřednictvím matky během těhotenství. U všech pediatrických pacientů mladších 3 let má být po expozici jodovaným kontrastním látkám zhodnocena funkce štítné žlázy. V případě výskytu hypotyreózy má být zvážena potřeba léčby a funkce štítné žlázy má být monitorována až do dosažení normalizovaného stavu.

#### *Extravazace*

Vzhledem ke své izotonicitě snižuje přípravek Visipaque ve srovnání s hyperosmolárními kontrastními látkami lokální bolest a extravaskulární otok. V případě extravazace je jako rutinní opatření doporučováno zvednutí postiženého místa a jeho chlazení. Chirurgická dekomprese může být nutná v případě, že dojde ke compartment syndromu.

#### Délka pozorování

Pacient by měl být po dobu alespoň 30 minut po podání kontrastní látky pod dohledem, protože v této době se vyskytne většina závažných nežádoucích účinků. Zkušenost však potvrzuje, že hypersenzitivní reakce mohou nastat v průběhu několika hodin až dní po injekci.

#### Intratekální podání

Po myelografii by měl pacient po dobu 1 hodiny zůstat v klidu v poloze s hlavou a hrudníkem zvednutými v úhlu 20°. Poté může opatrně chodit, ale musí se vyvarovat shybání. Pokud zůstává na lůžku, hlava a hrudník by měly být vyvýšeny po dobu prvních 6 hodin. Pacienti, u nichž je předpokladem nízký práh k záchvatům, by měli být po tuto dobu sledováni. Ambulantní pacienti nemají být úplně sami v průběhu prvních 24 hodin.

#### Hysterosalpingografie

Hysterosalpingografie nemá být prováděna v průběhu těhotenství (viz bod 4.6) nebo v případě akutního zánětlivého onemocnění pánve (PID).

### **4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce**

Všechny jodované kontrastní látky mohou ovlivnit vazebnou kapacitu jodu štítné žlázy, která může být snížena po dobu až několika týdnů, tudíž testy stanovující vychytávání jodu (s použitím radioaktivního jodu) budou ovlivněny.

Vysoké koncentrace kontrastní látky v séru a v moči mohou interferovat s laboratorními testy na obsah bilirubinu, proteinů nebo anorganických látek (např. železa, mědi, vápníku a fosfátů). Tyto látky by proto neměly být analyzovány v den vyšetření.

Podání jodovaných kontrastních látek může vést k přechodnému zhoršení renální funkce, což může u diabetiků užívajících metformin vyvolat laktátovou acidózu (viz bod 4.4).

U pacientů léčených interleukinem-2 po dobu méně než dvou týdnů před injekcí jodované kontrastní látky bylo zaznamenáno zvýšené riziko opožděných reakcí (příznaky podobné chřipce nebo kožní reakce).

Existují určité důkazy, že použití beta-blokátorů je rizikovým faktorem pro výskyt anafylaktoidních reakcí po podání rentgenových kontrastních látek (byla pozorována závažná hypotenze při použití rentgenových kontrastních látek podaných v průběhu léčby beta-blokátory).

#### **4.6 Fertilita, těhotenství a kojení**

##### Fertilita

Vliv přípravku Visipaque na lidskou reprodukci nebyl stanoven. Vyhodnocení experimentálních studií na zvířatech nenaznačuje přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukci.

##### Těhotenství

Bezpečnost přípravku Visipaque pro podání v těhotenství nebyla stanovena. Vyhodnocení experimentálních studií na zvířatech nenaznačuje přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukci, vývoj embrya nebo plodu, průběh těhotenství a perinatální a postnatální vývoj. Proto, pokud je to možné, je třeba se v průběhu těhotenství vyvarovat radiační expozice a mají být pečlivě zváženy výhody jakéhokoli rentgenového vyšetření s použitím kontrastní látky nebo bez ní proti možnému riziku. Pokud přínos nepřeváží riziko, a není to lékařem považováno za nezbytné, přípravek nemá být v průběhu těhotenství podáván.

U novorozenců, kteří byli in utero vystaveni jodovaným kontrastním látkám, je doporučeno sledovat funkci štítné žlázy (viz bod 4.4).

V průběhu těhotenství nemá být prováděna hysterosalpingografie (viz bod 4.4).

##### Kojení

Kontrastní látky jsou nepatrн vylučovány do mateřského mléka a minimální množství jsou absorbována ve střevech. Po podání jodovaných kontrastních látek může matka v kojení normálně pokračovat.

#### **4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje**

Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny, nedoporučuje se však řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje po dobu prvních 24 hodin po intratekálním vyšetření.

#### **4.8 Nežádoucí účinky**

Níže uvedené možné nežádoucí účinky se vztahují k radiografickým postupům zahrnujícím podání přípravku Visipaque.

Nežádoucí účinky související s přípravkem Visipaque jsou obvykle mírného až středně závažného a přechodného charakteru. Závažné reakce, stejně jako případy úmrtí, se objevují jen ve velmi vzácných případech, a mohou zahrnovat akutní selhání ledvin u pacientů s chronickým selháváním ledvin, akutní selhání ledvin, anafylaktický nebo anafylaktoidní šok, hypersenzitivní reakce následované kardiálními reakcemi (Kounisův syndrom), srdeční nebo kardiorespirační zástava a infarkt myokardu. Kardiální reakce může být podporována základním onemocněním nebo zákrokem.

Hypersenzitivní reakce se mohou projevovat jako respirační nebo kožní příznaky, jako je dyspnœ, vyrážka, erytém, kopřívka, pruritus, závažné kožní reakce, angioneurotický edém, hypotenze, horečka, laryngeální edém, bronchospasmus nebo plicní edém. U pacientů s autoimunitními chorobami byly pozorovány případy vaskulitidy a případy podobné Stevensovu-Johnsonovu syndromu.

Mohou se projevit bezprostředně po podání injekce nebo až za několik dní. Reakce hypersenzitivitu se mohou vyskytnout bez ohledu na dávku a způsob podání a mírné příznaky mohou představovat první známky závažné anafylaktoidní reakce/šoku.

Podání kontrastní látky musí být okamžitě přerušeno, a pokud je to nutné, má být v případě potřeby zahájena specifická terapie cévním přístupem. Pacienti užívající beta-blokátory mohou vykazovat atypické příznaky hypersenzitivitu, které mohou být chybně interpretovány jako vagová reakce.

Po podání jodovaných kontrastních látek je běžné mírné přechodné zvýšení hladiny kreatininu v séru, které však obvykle není klinicky významné.

#### Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány takto:

*Velmi časté* ( $\geq 1/10$ ), *časté* ( $\geq 1/100$  až  $< 1/10$ ), *méně časté* ( $\geq 1/1\,000$  až  $< 1/100$ ), *vzácné* ( $\geq 1/10\,000$  až  $< 1/1\,000$ ), *velmi vzácné* ( $< 1/10\,000$ ) a *není známo* (z dostupných údajů nelze určit).

Uvedené frekvence jsou založeny na interní klinické dokumentaci a publikovaných studiích zahrnujících více než 57 705 pacientů.

### Intravaskulární podání

#### Poruchy krve a lymfatického systému

- *není známo* - trombocytopenie

#### Poruchy imunitního systému

- *méně časté* - hypersenzitivita
- *není známo* - anafylaktický/anafylaktoidní šok, anafylaktická/anafylaktoidní reakce, včetně život ohrožující nebo fatální anafylaxe

#### Endokrinní poruchy

- *není známo* - hypertyreóza, přechodná hypotyreóza

#### Psychiatrické poruchy

- *velmi vzácné* - neklid, úzkost
- *není známo* - stav zmatenosti

#### Poruchy nervového systému

- *méně časté* - bolest hlavy
- *vzácné* - závratě, smyslové poruchy, včetně poruchy vnímání chuti, parestézie, parosmie
- *velmi vzácné* - cévní mozková příhoda, amnézie, synkopa, tremor (přechodný), hypoestézie
- *není známo* - kóma, porucha vědomí, křeče, přechodná kontrastní látkou indukovaná encefalopatie způsobená extravazací kontrastní látky, která se může projevit jako smyslová, motorická nebo celková neurologická dysfunkce (včetně amnézie, halucinace, paralýzy, parézy, dezorientace, přechodné poruchy řeči, afázie, dysartrie)

#### Poruchy oka

- *velmi vzácné* - kortikální slepota (přechodná), přechodné zhoršení zraku (včetně diplopie, rozmazaného vidění), edém očního víčka

### Srdeční poruchy

- *vzácné* - arytmie (včetně bradykardie, tachykardie), infarkt myokardu
- *velmi vzácné* - srdeční zástava, palpitace
- *není známo* - kardiorespirační zástava, ventrikulární hypokineze, trombóza koronární tepen

### Cévní poruchy

- *méně časté* - návaly
- *vzácné* - hypotenze
- *velmi vzácné* - hypertenze, ischémie
- *není známo* - šok, arteriální spasmus, trombóza, tromboflebitida

### Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

- *vzácné* - kašel, kýchání
- *velmi vzácné* - dyspnoe, podráždění hrdla, laryngeální edém, faryngeální edém
- *není známo* - nekardiogenní plicní edém, zástava dechu, respirační selhání, bronchospasmus, pocit příškrčení v hrdle

### Gastrointestinální poruchy

- *méně časté* - nauzea, zvracení
- *velmi vzácné* - bolesti břicha, průjem/diskomfort
- *není známo* - akutní pankreatitida, zhoršení pankreatitidy, zvětšení slinných žláz

### Poruchy kůže a podkožní tkáně

- *méně časté* - vyrážka nebo poléková vyrážka, pruritus, kopřivka
- *velmi vzácné* - angioedém, erytém, hyperhidroza
- *není známo* - bulózní nebo exfoliativní dermatitida, Stevensův-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, toxická epidermální nekrolýza, akutní generalizovaná exantematózní pustulóza, poléková vyrážka s eozinofilii a systémovými příznaky, alergická dermatitida, olupování kůže

### Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

- *velmi vzácné* - bolest zad, svalový spasmus
- *není známo* - artralgie

### Poruchy ledvin a močových cest

- *méně časté* - akutní poškození ledvin nebo toxicke nefropatie (kontrastní látkou indukovaná nefropatie)
- *není známo* - zvýšení hladiny kreatininu v krvi

### Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

- *méně časté* - pocit horka, bolest na hrudi
- *vzácné* - svalový třes (zimnice), pyrexie, bolest a diskomfort, reakce v místě podání, včetně extravazace, pocit chladu

- *velmi vzácné* - astenické stavy (např. malátnost, únava), otok obličeje, lokalizovaný edém
- *není známo* - otok

#### Poranění, otravy a procedurální komplikace

- *není známo* - jodismus

#### Intratekální podání

Nežádoucí účinky po intratekálním podání mohou být opožděny a projeví se několik hodin nebo i dní po vyšetření. Frekvence je podobná samotné lumbální punkci.

Po podání jiných neionických kontrastních látek bylo pozorováno meningeální dráždění spojené s fotofobií, meningismem a klinicky zjištěnou chemickou meningitidou. Je třeba také zohlednit možnost vzniku infekční meningitidy.

#### Poruchy imunitního systému

- *není známo* - hypersenzitivita, včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí

#### Poruchy nervového systému

- *méně časté* - bolest hlavy (může být závažná a dlouhotrvající)
- *není známo* - závrať, přechodná kontrastní látkou indukovaná encefalopatie způsobená extravazací kontrastní látky, která se může projevit jako smyslová, motorická nebo celková neurologická dysfunkce (včetně amnézie, halucinace, stavu zmatenosti, paralýzy, parézy, dezorientace, afázie, poruchy řeči)

#### Gastrointestinální poruchy

- *méně časté* - zvracení
- *není známo* - nauzea

#### Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

- *není známo* - svalový spasmus

#### Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

- *není známo* - svalový třes, bolest v místě vpichu

#### Hysterosalpingografie (HSG)

#### Poruchy imunitního systému

- *není známo* - hypersenzitivita

#### Poruchy nervového systému

- *časté* - bolest hlavy

#### Gastrointestinální poruchy

- *velmi časté* - bolest břicha
- *časté* - nauzea
- *méně časté* - zvracení

#### Poruchy reprodukčního systému a prsu

- *velmi časté* - poševní krvácení

#### Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

- *časté* - pyrexie
- *není známo* - třes, reakce v místě vpichu

#### Artrografie

##### Poruchy imunitního systému

- *není známo* - hypersenzitivita, včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí

#### Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

- *časté* - bolest v místě vpichu
- *není známo* - třes

#### Vyšetření gastrointestinálního traktu

##### Poruchy imunitního systému

- *není známo* - hypersenzitivita, včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí

##### Gastrointestinální poruchy

- *časté* - průjem, bolest břicha, nauzea
- *méně časté* - zvracení

#### Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

- *není známo* - třes

#### Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

#### **4.9 Předávkování**

Předávkování je u pacientů s normální renální funkcí nepravděpodobné. Z hlediska tolerance vysokých dávek kontrastních látek ledvinami je důležitá délka vyšetření ( $t_{1/2} \sim 2$  hodiny). Pokud by došlo k náhodnému předávkování, musí být ztráty vody a elektrolytů kompenzovány infuzí. Renální funkce má být monitorována po dobu nejméně 3 následujících dní. V případě potřeby je možné odstranit jodixanol z organismu pacienta hemodialýzou. Neexistuje žádné zvláštní antidotum. Léčba předávkování je symptomatická.

### **5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI**

## **5.1 Farmakodynamické vlastnosti**

Farmakoterapeutická skupina: kontrastní látky, rentgenkontrastní látky jodované  
ATC kód: V08AB09

Organicky vázaný jod absorbuje po injekci záření v krevních cévách/tkáních.

U většiny hemodynamických, klinicko-chemických a koagulačních parametrů sledovaných po intravenózním injekčním podání jodixanolu zdravým dobrovolníkům nebyly zjištěny významné odchyly od původních hodnot. Několik změn pozorovaných v laboratorních parametrech bylo nepatrného charakteru a bylo považováno za klinicky nevýznamné.

Přípravek Visipaque vyvolává u pacientů pouze malé účinky na renální funkci. U diabetických pacientů s hladinami sérového kreatininu 1,3–3,5 mg/dl vedlo podání přípravku Visipaque u 3 % pacientů ke zvýšení kreatininu o  $\geq 0,5$  mg/dl a u 0 % pacientů ke zvýšení kreatininu o  $\geq 1,0$  mg/dl. Uvolnění enzymů (alkalické fosfatázy a N-acetyl-beta-glukosaminidázy) z buněk proximálního tubulu je menší než po injekcích neionických monomerních kontrastních láttek a stejný trend je patrný ve srovnání s ionickými dimerními kontrastními látkami. Přípravek Visipaque je také dobře tolerován ledvinami.

Kardiovaskulární parametry jako LVEDP, LVSP, srdeční frekvence, QT interval a krevní průtok femorální tepnou jsou přípravkem Visipaque ovlivněny méně než jinými kontrastními látkami, pokud u nich byly příslušné hodnoty sledovány.

## **5.2 Farmakokinetické vlastnosti**

### Distribuce

Jodixanol je v těle rychle distribuován, s průměrným distribučním poločasem přibližně 21 minut. Rozsah zdánlivého distribučního objemu je totožný s extracelulární tekutinou (0,26 l/kg tělesné hmotnosti), což naznačuje, že jodixanol je distribuován výhradně v extracelulárním prostoru.

### Biotransformace

Žádné metabolity nebyly zjištěny. Vazba na proteiny plazmy je nižší než 2 %.

### Eliminace

Průměrný poločas eliminace je přibližně 2 hodiny. Jodixanol je vylučován především glomerulární filtrací ledvin. Po intravenózní injekci zdravým dobrovolníkům bylo přibližně 80 % podané dávky v průběhu 4 hodin a 97 % podané dávky v průběhu 24 hodin vyloučeno močí v podobě nemetabolizovaného přípravku. Pouze přibližně 1,2 % podané dávky je vyloučeno stolicí v průběhu 72 hodin. V moči se maximální koncentrace objeví v průběhu přibližně 1 hodiny po injekci.

V doporučeném rozsahu dávky nebyla pozorována závislost kinetiky na dávce.

Pro podání přípravku do tělních dutin nebyly provedeny žádné zvláštní studie farmakokinetiky.

## **5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti**

Testy reprodukce u potkanů a králíků nepřinesly žádný důkaz o poruše plodnosti či teratogenitě, související s jodixanolem.

## **6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE**

### **6.1 Seznam pomocných látek**

Trometamol  
Chlorid sodný  
Chlorid vápenatý  
Natrium-kalcium-edetát  
Roztok kyseliny chlorovodíkové 4,6 mol/l (k úpravě pH 7,2–7,6)  
Voda na injekci

### **6.2 Inkompatibility**

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky. K podání má být použita samostatná stříkačka.

### **6.3 Doba použitelnosti**

3 roky

### **6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání**

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

### **6.5 Druh obalu a obsah balení**

Tento přípravek je plněn do:

- 1) bezbarvých lahviček z borosilikátového skla o objemu 20, 50, 100 a 200 ml, které jsou uzavřeny halo-butyllovou zátkou zajištěnou odlamovacím barevným krytem. Lahvičky jsou baleny po 6 a 10 do papírové tvarované fólie a krabičky.
- 2) polypropylenových lahviček o objemu 50, 100, 150, 200 a 500 ml, které jsou uzavřeny halo-butyllovou zátkou a dodávány s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem se zataveným krytem s bezpečnostním kroužkem. Lahvičky jsou baleny po 6 a 10 do papírové tvarované fólie a krabičky.

Přípravek je dodáván v následujících velikostech balení:

Visipaque 270 mg I/ml:      10 skleněných lahviček s obsahem 20 ml  
                                        10 skleněných lahviček s obsahem 50 ml  
                                        10 skleněných lahviček s obsahem 100 ml  
                                      6 skleněných lahviček s obsahem 200 ml  
                                      10 polypropylenových lahviček s obsahem 50 ml  
                                      10 polypropylenových lahviček s obsahem 100 ml  
                                      10 polypropylenových lahviček s obsahem 150 ml  
                                      10 polypropylenových lahviček s obsahem 200 ml  
                                      6 polypropylenových lahviček s obsahem 500 ml

Visipaque 320 mg I/ml:      10 skleněných lahviček s obsahem 20 ml  
                                        10 skleněných lahviček s obsahem 50 ml  
                                      10 skleněných lahviček s obsahem 100 ml  
                                      6 skleněných lahviček s obsahem 200 ml

10 polypropylenových lahviček s obsahem 50 ml  
10 polypropylenových lahviček s obsahem 100 ml  
10 polypropylenových lahviček s obsahem 150 ml  
10 polypropylenových lahviček s obsahem 200 ml  
6 polypropylenových lahviček s obsahem 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

#### **6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním**

Lahvičky jsou určeny pouze pro jednorázové použití; všechny nepoužité části musí být znehodnoceny.

Podobně jako všechny parenterální přípravky, má být i přípravek Visipaque před podáním vizuálně zkontrolován s ohledem na případné částečky v roztoku, změnu jeho zbarvení a neporušenost obalu.

Přípravek má být natažen do stříkačky bezprostředně před podáním. Před podáním lze přípravek Visipaque zahrát na tělesnou teplotu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

### **7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

GE Healthcare AS  
Nycoveien 1  
P.O. Box 4220 Nydalen  
NO-0401 Oslo  
Norsko

### **8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA**

Visipaque 270 mg I/ml: 48/751/97-C  
Visipaque 320 mg I/ml: 48/752/97-C

### **9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE**

Datum první registrace: 10.09.1997  
Datum posledního prodloužení registrace: 17.06.2015

### **10. DATUM REVIZE TEXTU**

2. 4. 2022